Toxodon

Toxodon je rod vyhynulého savce, který žil v období pliocénu až pleistocénu na území Jižní Ameriky. Byl asi 2,7 metru dlouhý, v kohoutku byl vysoký 1,5 metru a vážil okolo 1,5 tuny. Jedním z prvních přírodovědců, kteří našli jeho zkameněliny, byl Charles Darwin, který získal lebku Toxodona v Uruguayi. Později objevil více jeho pozůstatků, jež všechny zaslal do Velké Británie známému přírodovědci a paleontologu Richardu Owenovi, který toxodona r. 1837 popsal. To, že se fosílie toxodonů z různých lokalit navzájem liší je jeden z mnoha důkazů evoluce.

Vědci se zpočátku domnívali, že Toxodon žil obojživelným způsobem života, podobně jako dnešní hroši, čemuž nasvědčovaly nozdry, umístěné vysoko na hlavě. Jeho fosílie jsou však nalézány v oblastech suchých a polosuchých. Po prozkoumání jeho kostry vyšlo najevo, že se stavbou těla podobal spíše dnešním nosorožcům.

Příčinou zániku jednoho z nejznámějších prehistorických savců mohli být pralidé, protože v blízkosti mnoha koster toxodonů byly nalezeny hroty šípů.

V populární kultuře

Toxodon je znám především svou rolí ve čtvrté epizodě fiktivně dokumentárního seriálu Prehistorický park. Zde je vyslovena domněnka, že podobně jako hroch obýval *Toxodon* okolí jezer.

Toxodon

Stratigrafický výskyt: Pliocén až Pleistocén, asi před 2,6 milionu až 16 000 lety

Kostra toxodona

Vědecká klasifikace

Říše	živočichové (Animalia)
Kmen	strunatci (Chordata)
Podkmen	obratlovci (Vertebrata)
Třída	savci (Mammalia)
Řád	Notoungulata
Čeleď	Toxodontidae
Podčeleď	Toxodontinae
Rod	*Toxodon* Owen, 1837

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rekonstrukce toxodona

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toxodon&oldid=17786086“

Stránka byla naposledy editována 29. 10. 2019 v 09:19.

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.
Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.